

КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ

УСЛОВИЯ ЗАРАЖЕНИЯ

1. Посещение леса

- ✓ Клещ сидит на травинках или деревьях.
- ✓ Не может летать или прыгать.
- ✓ Может цепляться за жертву.
- ✓ Может упасть на неё.



2. Занесение клещей животными собаками и кошками после прогулки.



3. Занесение клещей людьми на одежде, с цветами, ветками.

СПОСОБЫ ЗАРАЖЕНИЯ



- ✓ Укус клеща.
- ✓ Раздавливание и втирание присосавшегося клеща.
- ✓ Употребление в пищу инфицированного сырого козьего и коровьего молока.

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ

1. Носите в лесу специальную одежду

- ✓ Куртку или рубашку с длинным рукавом, с плотно застегнутыми воротом и манжетами.
- ✓ Головной убор.
- ✓ Высокую закрытую обувь, в которую можно заправить штаны.



2. Используйте репелленты

обрабатывайте одежду и открытые участки тела специальными защитными препаратами.

3. Осматривайте себя

не пренебрегайте само и взаимосомотрами на привалах и по возвращению домой.

4. Пейте кипяченое молоко



5. Сделайте прививку против клещевого энцефалита!

ЧТО ТАКОЕ ЭНЦЕФАЛИТ?

Энцефалит – вирусное природно-очаговое заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы.

Источниками вируса являются более 100 видов животных – крупный рогатый скот, птицы, грызуны и др.

ПЕРЕНОСЧИКИ ВИРУСА



размер в зависимости от вида
3-25 мм

Среда обитания:

в лесах, на полянах, в парках и других местах, где имеется трава и кусты.

Активность:

теплое время года, с апреля по октябрь, пик активности – июнь-июль.

Как нападает:

Клещ незаметно впивается в кожу жертвы, выделяет со слюной анестезирующее и разжижающее кровь вещество, обезболивающее процесс присасывания. Человек может длительное время не ощущать прикрепившегося клеща.

Через несколько часов после укуса голова насекомого полностью погружается под кожу человека, а брюшко раздувается от выпитой крови.



3-4 мг

40-500 мг

Вирус сохраняется в течение всей жизни клеща!

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ

1. Инкубационный период

длится 1,5 - 2 недели.



2. Поражение коры головного мозга

длится несколько дней.

3. Воспаление мозга

Симптомы: головные боли, рвота, потеря сознания (вплоть до комы), температура тела 39-40°.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ УКУСЕ КЛЕЩА

1. Используйте нить для извлечения клеща

Почную нитку завязать в узел как можно ближе к хоботку клеща, затем извлечь клеща, медленно раскачивая и подтягивая его вверх.



2. Если на коже осталась черная точка

Во время извлечения клеща оторвалась его головка или хоботок. Обработайте место укуса спиртом или 5% раствором йода и, затем, удалите головку стерильной иглой (предварительно прокаленной на огне) также, как удаляете обычную занозу.

3. Продезинфицируйте место укуса

Как можно быстрее обработайте место укуса клеща любым дезинфицирующим средством – 3-5% раствором зеленки, 5% раствором йода, спиртом и т.п.

4. Тщательно вымойте руки с мылом

5. Обратитесь к врачу

Клеща необходимо исследовать на наличие инфекции. Поместите клеща в стеклянный флакон вместе с слегка намоченным кусочком ваты, плотно закройте крышкой. Храните в холодильнике не более 2 суток.

- ✓ Брать клеща голыми пальцами, раздавливать! **Что делать нельзя!**
- ✓ Делать резкие движения – клещ разорвется!
- ✓ Использовать масло – оно закупорит дыхательные отверстия, и клещ может умереть, так и оставшись в коже!